Machine Translated by Google

NOVAFON

affiche avec
Suggestions de traitement sur le dos

Embouts intra-oraux pour le NOVAFON

Machine Translated by Google

LES ACCESSOIRES INTRA-ORAUX

Objectifs et applications du traitement

FIXATION DE FLÈCHE

Avec motif de flèche et picots pour plus de polyvalence stimulation

– Régulation du tonus des muscles masticateurs
– Favoriser la perception intra- et extra-orale
– Formation du sillon de la langue

1. RÉGULATION DU TON DES MUSCLES MAUDIENTS

Objectif : Améliorer la mobilité et soulager la douleur

Placez l'attache flèche à l'intérieur de votre joue et, si nécessaire, attardez-vous sur les points douloureux. Étirez les muscles masticateurs vers la bouche.

2. FORMATION DES SILLONS DE LA LANGUE

Objectif : Augmenter le contrôle des bolus
Placez l'attache de flèche avec l'une des deux surfaces structurées au milieu de la languette et maintenez-la là ou caressez la rainure médiane de la languette d'arrière en avant.

hors de.



FIXATION SPATULE

Antidérapant grâce au motif X, facile à glisser

Ondulation longitudinale

– Renforcement de la langue
– Stimulation de la langue et des joues
– Tonification des lèvres

1. RENFORCEMENT DE LA LANGUE

Objectif : Renforcement de la langue
Stimulez d'abord l'arrière de la langue, les bords de la langue, le bout de la langue et le dessous de la langue sur une large zone. Donnez ensuite une impulsion de pression prudente et demandez à la personne à traiter d'appliquer une contre-pression.

générer.

2. STIMULATION DE LA LANGUE ET DES JOUES

Objectif : augmenter le tonus
Effectuez un tapotement plat d'arrière en avant. Placez la spatule sur la langue avec une surface de contact la plus grande possible ; idéalement, la langue doit être recouverte aux 2/3. Stimulez l'intérieur de la joue en plaçant la spatule dans la joue et en créant une légère contre-pression de l'extérieur.

3. TONIFIER LES LÈVRES

Objectif : Promouvoir la fermeture de la bouche
Placez la spatule entre les lèvres, puis encouragez les lèvres à se fermer. Demandez à la personne traitée de tenir la spatule avec ses lèvres.

FIXATION CUILLÈRE

Avec évidement pour cuillère pour donner de la nourriture, picots pour une meilleure détection

– Entraînement à la déglutition avec de la nourriture
– Entraînement du bout de la langue
– Stimulation du dos de la langue

1. FORMATION À LA POINTE DE LA LANGUE

Objectif : Augmenter la motilité du bout de la langue
Remplissez le creux avec une petite quantité de consistance collante (miel ou crème au chocolat ; attention : exercice déconseillé aux patients à risque d'aspiration !) et placez l'embout cuillère avec les picots pointés en proximal sur le palais ou dans les poches des joues. . Demandez maintenant à la personne traitée d'en rechercher le contenu avec le bout de sa langue et de le lécher.

2. STIMULATION DE LA LANGUE

Objectif : déclencher le réflexe de déglutition et l'élévation du dos de la langue
Placez l'embout cuillère avec le dessous boutonné sur l'arrière de la langue et laissez la personne traitée ressentir la vibration.
Donnez une légère impulsion de pression et encouragez la déglutition active ou venez.
combinez cet exercice avec l'entraînement de l'articulation de la 3ème zone d'articulation.

TIGE À BILLE

Pour une application précise et précise grâce à la petite boule au bout de l'embout

– Stimulation des arcs palatins antérieurs
– Lieu d'articulation de l'informateur
– Développement d'un sillon médian de la langue

1. STIMULATION DE L'ARC PALAIS ANTÉRIEUR

Objectif : déclenchement du réflexe de déglutition, élévation du voile
Passez le bout de la balle le long des côtés des arcs palatins antérieurs. Si nécessaire, un stimulus thermique ou gustatif peut être ajouté. Pour cela, trempez la tête d'embout dans de l'eau glacée ou dans un peu de compote de pommes, de poudre effervescente, etc. Demandez ensuite à la personne traitée d'avaler à volonté.

Demandez à la personne traitée de prononcer un « a » pour créer une élévation du velum.

2. NOTE PRÉCISE SUR LE LIEU D'ARTICULATION Objectif :

Mouvement d'articulation ciblé
Stimulez la zone d'articulation du palais pour montrer à la langue un point cible. La langue peut également être « marquée » en conséquence. Demandez ensuite à la personne traitée d'articuler le son souhaité.

Machine Translated by Google

CUILLÈRE D'ENTRAÎNEMENT

Options multifonctionnelles pour l'entraînement de la langue

– Formation d'accueil
– Guidage de la langue
– Favoriser l'élévation du bout de la langue

1. FORMATION AUX ENCHÈRES

Objectif : Renforcement de la langue

Placer l'embout avec la courbure vers le haut sur le tiers antérieur du palais (à la transition vers la crête alvéolaire) et demander à la personne à traiter de palper l'ouverture ronde avec sa langue et de sucer le bout ou le milieu de la langue pendant plusieurs secondes.

2. GUIDE-LANGUE

Objectif : Coordination améliorée

La langue est sortie de la bouche en position droite et s'appuie plusieurs fois contre l'évidement rond de la tête de fixation avec une courte tension. Le bout de la langue appuie légèrement à travers l'évidement rond.

3. PROMOTION DE L'ÉLÉVATION DE LA POINTE DE LA LANGUE

Objectif : Renforcer le bout de la langue

L'embout est positionné horizontalement ou verticalement devant les lèvres, le bout de la langue tape l'un après l'autre du milieu dans les trois évidements et revient en position médiane. Cette séquence est répétée plusieurs fois dans toutes les directions et peut être variée individuellement.

CUILLÈRE SENSO

Structure de bouton pour l'administration de bolus avec vibrotactile stimulus

– Administration de bolus avec stimulus vibrotactile
– Stimulation de l'arrière de la langue
– Entraînement à la déglutition

1. ADMINISTRATION EN BOLUS AVEC STIMULUS VIBROTACTILE

Objectif : promouvoir la perception

Positionner un petit bolus sur la cuillère-capteur et faire passer le et mettre le NOVAFON au niveau 1 (100 Hz) dès que la cuillère passe les lèvres et se pose sur la langue pour donner une courte impulsion de mouvement. La personne soignée prend maintenant la nourriture. Le placement correct du bolus et de la fermeture des lèvres peut être appris ici. La structure à picots rend la cuillère sensorielle facile à percevoir et fournit des stimuli vibrotactiles.

2. STIMULATION DU DOS DE LA LANGUE

Objectif : Améliorer l'élévation de l'arrière de la langue

Placez la cuillère sensorielle sur le tiers arrière de la langue. La cuillère peut être dirigée vers le bas ou vers le haut afin de créer la stimulation la plus étendue possible. Demandez au patient d'articuler un « k » tout en apportant une légère résistance avec l'attachement. Lorsque vous faites des exercices de résistance, assurez-vous de tenir légèrement l'embout avec votre index afin de pouvoir corriger la position de l'embout sur votre langue en conséquence.

TIGE À BILLE XL

Rotule élargie pour une stimulation intensive

– localisation simplifiée grâce à une sphère plus grande
– Régulation du tonus des muscles masticateurs
– Stimulation du dessous de la langue

1. LOCALISATION SIMPLIFIÉE GRÂCE À UNE SPHÈRE PLUS GRANDE

Objectif : amélioration de la perception

Tapez différentes zones de la langue avec le bâton à bille. La personne soignée a pour tâche de localiser précisément la zone et rapportez-le.

2. RÉGULATION DU TON DES MUSCLES À MÂCHER

Objectif : Fermeture des lèvres Pour augmenter le tonus des lèvres et activer la fermeture des lèvres, utilisez le Ball Wand XL au niveau 1 (100 Hz) à l'extérieur et à l'intérieur des lèvres.

3. STIMULATION DU BAS DE LANGUE

Objectif : Stimuler la salivation

Placez l'embout en diagonale vers l'extérieur dans le tiers inférieur de la joue et travaillez par mouvements circulaires. Leur demander la personne à traiter suite au Stimulation vibrotactile, alternant pincer les lèvres, déplacer les lèvres pincées sur le côté, rentrer la joue ou enfoncer la langue dans les joues afin de générer le plus de flux de salive possible.

ROULEAU À OLIVES

Olive rotative avec structure boutonnée, diverses options de stimulation intra et extraoral

– Favorise la perception grâce à l'olive rotative
– Favorise la motilité de la langue
– Renforcement des muscles de la langue

1. PROMOTION DE LA PERCEPTION

Objectif : Améliorer la sensibilité

Faites rouler le rouleau à olives sur la moitié de la langue ou le long des bords de la langue (stimulus passif), puis demandez à la personne traitée d'effectuer un exercice actif, comme façonner la langue pour qu'elle soit pointue et large. Si nécessaire, un stimulus thermique ou un stimulus gustatif peut être ajouté à titre de comparaison.

2. PROMOTION DE LA MOTICITÉ DE LA LANGUE

Objectif : Améliorer la coordination

Positionnez le rouleau à olives horizontalement devant vos lèvres ou au milieu de votre langue et essayez de faire tourner l'ovale mobile à l'avant du rouleau à olives avec votre langue. Cela peut être fait dans un mouvement latéral ou en faisant rouler la langue d'arrière en avant.

Machine Translated by Google

INFORMATIONS GÉNÉRALES

pour l'hygiène et Application

Notes d'hygiène : Les embouts intra-oraux peuvent être réutilisés sur différents patients avec la préparation hygiénique appropriée. Des informations détaillées sur le nettoyage et la désinfection figurent dans le mode d'emploi. Ceci est également disponible sur novafon.de/download-bereich. Si vous avez des questions sur la bonne méthodologie, n'hésitez pas à nous contacter.

Les accessoires peuvent être tournés dans l'adaptateur et facilement retirés pour un alignement optimal pour le traitement.

Général : Veuillez noter qu'un plan de traitement individuel doit être établi pour chaque personne à traiter en fonction de sa(ses) maladie(s) sous-jacente(s), de sa constitution, de ses ressources et de ses réactions réflexes.
et la société NOVAFON ne dispose d'aucune information à ce sujet peut donner. Les exemples donnés doivent être compris comme tels et ne peuvent pas être appliqués à toutes les personnes traitées. Il existe en outre de nombreuses autres utilisations possibles, qui ne peuvent pas toutes être énumérées en détail ici. Veuillez également respecter les instructions contenues dans la notice d'utilisation de votre appareil et des embouts intra-oraux.

Vous trouverez de plus amples informations sur la formation continue sur le thème « Applications de l'orthophonie avec le NOVAFON et utilisation des embouts intra-oraux » sur novafon.de/academy.

D'autres applications de NOVAFON en orthophonie sont disponibles sur novafon.de/logopaedie.

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS

Fixation des attaches sur votre NOVAFON

Les attaches intra-orales sont livrées avec un Adaptateur fixé au NOVAFON. L'adaptateur est inclus dans la livraison. Voici une description de la façon de joindre les pièces jointes à votre appareil à l'aide de l'adaptateur :

1. Insérez l'accessoire dans l'adaptateur (représenté ici en blanc).

2. Fixez les deux à l'appareil à l'aide du connecteur magnétique.

3. Alignez l'accessoire. Pour ce faire, tenez l'adaptateur d'une main et tournez l'embout de l'autre main.

Vous pouvez maintenant commencer le traitement. Allumez l'appareil uniquement lorsque l'embout entre en contact avec la région à traiter. Évitez tout contact avec vos dents.



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

APPLICATIONS INTRA-ORALES AVEC LE NOVAFON

Utilisez les accessoires, par exemple, pour traiter les troubles de la parole et de la déglutition.

Cela permet de définir des stimuli de stimulation intra- et extra-oraux.

Désensibilisation et sensibilisation, régulation du tonus ou entraînement de la motricité, les exemples d'application sont variés.

NOVAFON

Améliorer la perception intra- et extra-orale

Informations précises sur le lieu d'articulation

Objectif : Mouvement d'articulation ciblé

Application : Stimulez la zone d'articulation du palais avec le bâton à bille pour montrer à la langue un point cible. La langue peut également être « marquée » en conséquence. Demandez ensuite à la personne traitée d'articuler le son souhaité.

Tonifier les lèvres

Objectif : Promouvoir la fermeture de la bouche

Mode d'emploi : Placez l'embout spatule entre les lèvres puis encouragez les lèvres à se fermer. Demandez à la personne traitée de tenir la spatule avec ses lèvres.

Stimulation de la langue et des joues

Objectif : augmenter le tonus

Application : Effectuer un tap-ping plat d'arrière en avant. Placez la spatule sur la langue avec une surface de contact la plus grande possible ; idéalement, la langue doit être recouverte aux 2/3. Stimulez l'intérieur de la joue en plaçant la spatule dans la joue et en créant une légère contre-pression de l'extérieur.

Stimulation de la langue

Objectif : Favoriser la motilité de la langue

Application : Positionner le rouleau à olives horizontalement devant les lèvres ou au milieu de la langue et demander à la personne à traiter de faire tourner l'ovale mobile situé à l'avant du rouleau à olives avec sa langue. Cela peut être fait dans un mouvement latéral ou en faisant rouler la langue d'arrière en avant.

Muscles à mâcher

et entraînement à la déglutition

Formation d'admission

Objectif : Favoriser l'élévation de la langue

Application : Placer la cuillère d'entraînement avec la courbe vers le haut sur le tiers avant du palais (à la transition vers le périnée alvéolaire). Demandez à la personne traitée de sentir l'ouverture ronde avec sa langue et de sucer le bout ou le milieu de la langue pendant plusieurs secondes.

Régulation du tonus des muscles masticateurs

Objectif : Améliorer la mobilité et soulager la douleur

Application : Placer l'embout flèche sur la face intérieure de la joue et, si nécessaire, s'attarder sur les points douloureux. Étirez les muscles masticateurs vers la bouche.

Application de petites quantités de nourriture

Objectif : Augmenter la motilité du bout de la langue

Application : Remplissez le creux de l'embout cuillère avec une petite quantité de consistance collante (miel ou crème au chocolat ; attention : exercice déconseillé aux patients à risque d'aspiration !) et placez l'embout cuillère avec les picots pointés proximalement vers le palais ou dans la joue. les poches. Laissez maintenant la personne traitée rechercher le contenu avec le bout de sa langue et le lécher.

Administration de bolus avec stimulus vibrotactile

Objectif : Améliorer l'apport nutritionnel

Application : Positionner un petit bolus sur la cuillère capteur, puis passer le et mettre le NOVAFON au niveau 1 (100 Hz) dès que la cuillère passe les lèvres et est posée sur la langue pour effectuer un traitement court. impulsion. La personne soignée prend maintenant la nourriture.

Le placement correct du bolus et de la fermeture des lèvres peut être appris ici.

Langue

Stimulation du dos de la langue

Objectif : déclencher le réflexe de déglutition et l'élévation du dos de la langue

Application : Placer l'embout cuillère avec le dessous boutonné sur l'arrière de la langue et quitter la zone à traiter.

la personne peut ressentir la vibration. Donnez une légère impulsion de pression et encouragez la déglutition active ou combinez cet exercice avec un entraînement de l'articulation de la 3ème zone d'articulation.

Formation du sillon de la langue

Objectif : Augmenter le contrôle des bolus

Application : Placez l'embout de flèche avec l'une des deux surfaces structurées au milieu de la languette et maintenez-le là ou caressez la rainure médiane de la languette d'arrière en avant.

Guidage de la langue

Objectif : améliorer la motilité de la langue

Application : La personne traitée déplace le bout de la langue dans l'évidement rond de la cuillère d'entraînement. Vous pouvez maintenant déplacer passivement votre langue sur le côté.

Mobilité de la langue

Objectif : améliorer la motilité de la langue

Application : Positionner le rouleau à olives au milieu de la langue et demander à la personne à traiter de faire tourner avec sa langue l'ovale mobile situé à l'avant du rouleau à olives. Cela peut être fait dans un mouvement latéral ou en faisant rouler la langue d'arrière en avant.